



Hodowco! Czy wiesz już jak zatrzymać ASF?

Najważniejsze są najbliższe miesiące: maj-sierpień!
W tym czasie trzeba podjąć intensywne działania i skupić się
na najważniejszych zagrożeniach.

Jak to zrobić?

Trzymaj dziki na dystans

Kontroluj teren wokół ферmy minimum
1x na 2 tygodnie

Zabezpiecz fermę siatkami przeciwko ptakom

**Zabezpiecz przed ptakami miejsca składowania
padliny**

Utrzymuj w czystości teren wokół ферmy

Minimum 1x na 2 tygodnie wykonuj sprzątanie
i dezynfekcję miejsc wokół ферmy i sprzętu
rolniczego.

Kontroluj **czystość i dezynfekuj pojazdy
wjeżdżające** na teren ферmy, oraz każdorazowo **myj
i zdezynfekuj miejsca kontaktowe**

Stosuj poprawnie **preparaty przeciwko owadom
na zewnątrz obiektów jak i w środku.**



**PAMIĘTAJ, ŻE ZAPYLENIE WEWNĄTRZ FERMY I KURZ OSIADAJĄCY NA POWIERZCHNIACH
OGRA NICZA DZIAŁANIE WIELU PREPARATÓW!**

Minione lata pokazują, że największa liczba zakażeń świń przypadła na okresy letnie.
Jeśli nie wpuścimy wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń do naszych stad
w najbliższych 3 miesiącach, wygramy.

Największym zagrożeniem dla Twojej ферmy jest dzik, człowiek i mucha.

**HODOWCO! NIE DAJ SIĘ POKONAĆ WIRUSOWI ASF!
BĄDŹ SPRYTNIJSZY!**



Agri Plus